

NOME SCIENTIFICO:

BERARDIA SUBACAU LIS Vill.

SINONIMO:

Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori

NOME COMUNE:

Berardia

FAMIGLIA: *Asteraceae* (*Compositae*)

ORIGINE: Endemismo Alpi Marittime e Cozie

ALTEZZA: 5-15 cm

FIORITURA: Luglio-Agosto

HABITUS



Erbacea perenne, quasi completamente acaule

FOGLIA



Le basali riunite in densa rosetta, coriacee, ovate o subrotonde, denticolate ai margini, densamente lanuginosa sulla pagina superiore, bianco tomentosa su quella inferiore

RADICE



Rizoma robusto lungamente strisciante



Specie dedicata a Bérard (secolo XVIII) botanico di Grénoble, compose una flora illustrata del Delfinato rimasta inedita. Erbacea perenne alta 5-15 cm, quasi completamente acaule, con un robusto rizoma strisciante. Le foglie basali, coriacee, portate da un picciolo lungo 2-5 cm, sono riunite in una densa rosetta. La lamina fogliare, caratteristicamente reticolata, ovata o subrotonda, lunga 5-10 cm e denticolata ai margini, è densamente lanuginosa tomentosa sulla pagina superiore e bianco cotonosa su quella inferiore. Le foglie cauline sono simili ma generalmente più strette. I capolini, quasi emisferici, larghi 4-7 cm, sono sempre solitari alla sommità del fusto, circondati da un involucri di squame lanceolate e lanose. I fiori sono tutti tubulosi e giallastri. Il frutto è un achenio trigono sormontato da un pappo setoloso, rossastro.

Origine e diffusione: endemismo delle Alpi Marittime e Cozie, presente (rara) sia sui versanti italiani che francesi.

Habitat: luoghi rocciosi, macereti e ghiaioni, preferibilmente su calcescisti e terreni calcarei, da 1800 a 2700 m di altitudine.

Ripresa: Valle dell'Oronaye, oltre il Colle della Maddalena (Cuneo)







